

Аивасова Иисун 11.02.14

№1

1-коричневая ; 2-лиловая ; 3-красная ;
4-розоватая ; 5-лиловатая

№2

	мелкий	средний	крупный
8-14 мес.	18	36	45
7-15 лет	35	28	37
30-50 лет	28	22	34
старше 50 лет	21	21	30

№3

1. Скошеное - боковое искривление
2. Кифоз характеризуется изгибом оси назад. Позвоночник принимает неправильную форму, из-за чего осанка выглядит сутулой.
3. Лордоз - отклонение оси позвоночника вперед

№4

1. Скофоцефалия - своеобразно удлиненная, сравнительная с боковой формой черепа.

2. Брахичефалия - развивается при поврежденном окостенении венечного шва
3. Синдром Крузе - раннее заращение венечного шва сопровождается недоразвитием мазины, клиновидной кости, костей лицевого черепа, при котором крошечная сочетается с экзостазными из-за недоразвития мазины, лобовой кости
4. Планоцефалия - при одностороннем поврежденном закрытии венечного шва отмечаются уплощение шва, недоразвитие мазины
5. Тригоцефалия - при патологическом шве черепа приобретает треугольную форму.
6. Акроцефалия - раннее заращение нескольких швов приводит к общему уменьшению объема черепа, его деформации с недоразвитием синусов

н 5

А - Вальгусный тип деформации (колено отклонено внутрь). Из-за наклонной оси между бедром и голенью, направленной внутрь, вес тела приходится на одну сторону колена. Возникает как следствие плоскостопия и является причиной пакуменкино-бедренного бокового синдрома.

Б - Варусный (колено, отклонено наружу). Является причиной подвздошно-большеберцового синдрома. Причина: появление дополнительной нагрузки на боковую сторону коленного сустава.

н 6.

Подометрия - измерение временных характеристик шага при ходьбе.

Подометрический индекс - (н. 100):

За показатель нормы берет подометр. индекс 29-31, его увеличение / уменьшение свидетельствует

признакши повнение /снннене своде етот.

- Нормальная - отпечаток имеет перешеек, который соединяет область пяточной кости с областью головок плюсневых костей.

- Сводчатая (тоньше нормы) - соединении нет, стопа опирается на землю только передним и задним отделами, не имеет опоры посередине.

- Плоская - дает слишком отпечаток, без впадины в среднем отделе.

№7.

1 - lig. tibio fibulare anterius - переднее межберцовое связное

2 - lig. art. tarsi transverso - поперечный сустав предплюсны (Монров сустав)

3 - art. tarsometatarsae - предплюсневые - плюсневые суставы (сустав Лиссгарана)

4 - lig. tarsometatarsalia dorsalia - тыльные

предметные - предметные связи

и 8

1) 6

2) а

3) 5

4) 2

5) 6

6) 2